

## ERRATUM

doi: 10.33963/v.phj.111393

W tekście „W jaki sposób wyniki badania COMPASS mogą się przysłużyć polskim pacjentom z chorobą wieńcową lub chorobą tętnic obwodowych?” (Kruger P.C., Guzik T.J., Eikelboom J.W. Kardiol Pol Zeszyty Edukacyjne. 2019; 6: 105–117) w streszczeniu:

<b>podano:</b>	<b>winno być:</b>
W badaniu z randomizacją i grupą kontrolną COMPASS (Cardiovascular Outcomes in People Using Anticoagulation Strategies), którym objęto 27 395 chorych z 602 ośrodków w 33 krajach (w tym 518 chorych z 9 ośrodków w Polsce), oceniano, czy u osób z przewlekłą stabilną tętnicą wieńcową i/lub chorobą tętnic obwodowych leczenie przeciwzakrzepowe małymi dawkami rywaroksabanu (inhibitora czynnika krzepnięcia Xa), lub rywaroksabanu w połączeniu z ASA, zmniejsza ryzyko zakrzepowe w porównaniu ze stosowaniem samego ASA.	W badaniu z randomizacją i grupą kontrolną COMPASS (Cardiovascular Outcomes in People Using Anticoagulation Strategies), którym objęto 27 395 chorych z 602 ośrodków w 33 krajach (w tym 518 chorych z 9 ośrodków w Polsce), oceniano, czy u osób z przewlekłą stabilną chorobą wieńcową i/lub chorobą tętnic obwodowych leczenie przeciwzakrzepowe małymi dawkami rywaroksabanu (inhibitora czynnika krzepnięcia Xa), lub rywaroksabanu w połączeniu z ASA, zmniejsza ryzyko zakrzepowe w porównaniu ze stosowaniem samego ASA.

Wersja *online* artykułu na:

[https://journals.viamedica.pl/polish\\_heart\\_journal/article/view/83193](https://journals.viamedica.pl/polish_heart_journal/article/view/83193) jest poprawna.